

甲苯胺蓝染色液(0.5%,磷酸盐法)

产品货号: R21637

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

甲苯胺蓝(Toluidine Blue O)是一种常用的人工合成染料,属于醌亚胺染料类,这类染料主要含有胺基和醌型苯环两个发色团,从而成色原显色。甲苯胺蓝中的阳离子有染色作用,组织细胞的酸性物质与其中的阳离子相结合而被染色。甲苯胺蓝还含有两个助色团,能促使染料产生电离成盐类,帮助发色团对组织产生染色力,使切片上的组织细胞着色,可染细胞核使之呈蓝色。另外,肥大细胞胞质内含有肝素和组织胺等异色性物质,遇到甲苯胺蓝可呈异染性紫红色。临床上,经常用甲苯胺蓝对软骨细胞和肥大细胞进行染色。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
甲苯胺蓝染色液(0.5%,磷酸盐法)	100ml/500ml	室温,避光

操作步骤(仅供参考):

(一)肥大细胞染色

- 1. 脱蜡至蒸馏水。
- 2. 根据切片厚度和组织的不同,浸染于甲苯胺蓝染色液 5~30min。
- 3. 蒸馏水或去离子水轻轻冲洗 3~5min。
- 4. (可选)0.5%冰乙酸分化,直到细胞核和颗粒清晰可见。
- 5. 快速 95%和无水乙醇脱水。
- 6. 二甲苯透明,封固。

染色结果: 肥大细胞呈紫红色; 背景呈淡蓝色。

(二)软骨染色

- 1. 石蜡切片入二甲苯 2 次,每次 15min。
- 2. 系列乙醇各 1min。
- 3. 自来水洗 2min。
- 4. 入 Toluidine Blue O Stain, 浸染 10~15min。
- 5. 自来水洗 2min, 滤纸吸干水分。
- 6. 丙酮分化至软骨细胞呈紫蓝色清楚可见。
- 7. 逐级乙醇脱水。
- 8. 二甲苯透明,中性树胶封固。

染色结果: 软骨、成骨细胞呈紫红色; 背景呈淡蓝色。

(三)细胞涂片染色

- 1. 用 20%的乙醇溶液稀释甲苯胺蓝染色液 , 一般要求稀释到 0.1%即可。
- 2. 细胞涂片后,立即放入95%的乙醇中固定15s,取出放在纸巾上。
- 3. 滴加 1~2 滴稀释后的甲苯胺蓝染色液进行滴染,加盖玻片让染料渗透到细胞中。
- 4. 10~15s 后将玻片竖起,稍加压力,使多余染料被纸巾吸去。
- 5. 无需干燥,直接镜检。

染色结果:细胞核、淋巴细胞呈深蓝色;核仁呈紫红色;红细胞呈橘红;细胞质、单核细胞呈淡蓝色。





(四)原位杂交染色

- 1. 用蒸馏水或去离子水稀释到相应的浓度, 凭经验一般稀释比例大于 1:100。
- 2. 玻片在稀释好的染色液中短暂浸泡。
- 3. 在蒸馏水或去离子水浸泡数次。
- 4. 按需求进行压片固定。

注意事项:

- 1. 针对于胃粘膜组织、软骨组织等较难着色组织的染色,浸染于甲苯胺蓝染色液的时间应相应延长。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。