

DAB辣根过氧化物酶显色试剂盒 (20×)

产品货号: T15131

产品规格: 2×10ml/2×50ml

产品简介:

DAB辣根过氧化物酶显色液(DAB Horseradish Peroxidase Color Development Kit)是一种依据辣根过氧化物酶(HRP)结合显色,用于免疫组化显色、原位杂交显色或Western、Southern、Northern、EMSA等膜显色的试剂盒。DAB即3,3N-Diaminobenzidine Tertrahydrochloride, 是辣根过氧化物酶的常用底物。

乐业生物 DAB辣根过氧化物酶显色试剂盒可以用于细胞或组织在免疫组化或原位杂交时结合的辣根过氧化物酶显色,也可用于Western等结合有辣根过氧化物酶的膜的显色检测以及细胞或组织内源性的辣根过氧化物酶显色。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	2×10ml	2×50ml	保存条件
试剂(A): DAB显色液A	10ml	50ml	-20℃, 避光
试剂(B): DAB显色液B	10ml	50ml	-20℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 常规组织切片、细胞样品、膜与辣根过氧化物酶标记的抗体或其它形式的探针孵育后,用适当洗涤液洗涤3~5次,每次3~5min。对于检测内源性辣根过氧化物酶的组织或细胞样品,在适当固定后,也可用洗涤液洗涤3~5次,每次3~5min。
2. 按(A):试剂(B):蒸馏水=的比例混合,即为DAB显色工作液,即配即用。
3. 洗涤过组织后,去除洗涤液,加入适量DAB显色工作液,确保覆盖样品。
4. 室温避光孵育或更长时间,直至显色至预期深浅。
5. 去除DAB显色工作液,用蒸馏水清洗1~2次即可终止显色反应。
6. 对组织切片或细胞样品,反应终止后,如有必要可用中性红染色液染色,便于观察。对于膜染色,反应终止后可室温晾干避光保存。

注意事项:

1. DAB是致癌物,请注意适当防护。
2. 试剂(A)、试剂(B)避免反复冻融,以免效率下降。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

常见问题及可能原因:

1. 背景显色太深
 - 1) 在进行含内源性过氧化氢酶的免疫组化时,如果背景显色太深,需注意灭活内源性过氧化氢酶。可以在4体积甲醇中加入1体积3%过氧化氢,混匀后用于内源性过氧化氢酶的灭活。
 - 2) 可以考虑缩短显色时间,或降低二抗浓度。
 - 3) _x0001_选择适当强度的洗涤液,或延长洗涤时间。
2. 没有显色或显色太弱
 - 1) 当提高一抗或二抗的浓度。检测二抗效果,滴一滴稀释二抗在膜上,检测二抗是否可以被正常显色。
 - 2) 考虑使用更加灵敏的放大检测体系,例如使用生物素检测体系。
 - 3) 适当延长显色时间,另外确定抗原修复是否对于使用的一抗是必需的。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com